

## 胆道癌レジメン

療法名	投与量	投与日	投与期間
GC	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	3週毎
	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
Durvalumab + GC	デュルバルマブ 1500mg/body (体重30kg以下は20mg/kg)	day1	3週毎で8コースまで ※その後は Durvalumab単剤で 4週毎
	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
Pembro + GC	ペムプロリスマブ 200mg/body	day1	3週毎で8コースまで ※その後はPembro +Gで3週毎
	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
GCS	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	day1	2週毎
	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup>	day1	
	S-1 40mg/m <sup>2</sup> /回,1日2回	day1~7	
GS	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	3週毎
	S-1 40mg/m <sup>2</sup> /回,1日2回	day1~14	
GEM	ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎